

- 1) Квазиоднородные формы степени d с весами $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$

Пусть $g(x, y) = (\lambda^\alpha x, \lambda^\beta y)$, $\lambda > 0$

Определение

w - квазиоднородная форма степени d с весами α и β , если $g^*w = \lambda^d w \quad \forall \lambda > 0$

- 2) Пусть $w = Mdx + Ndy$, $M, N \in \mathbb{R}[x, y]$
 тогда $w = \sum_{k, l} a_{kl} x^{k-1} y^l dx + \sum_{k, l} b_{kl} x^k y^{l-1} dy$

Определение

Диаграммой Ньютона формы w называется множество $\{(k, l) \in \mathbb{Z}^2 \mid a_{kl} + b_{kl} \neq 0\}$

Теорема

Если диаграмма Ньютона формы w лежит на прямой $\alpha k + \beta l = d$, то w - квазиоднородная форма степени d .

Доказательство


Пусть g - квазиоднородное растяжение ($g(x, y) = (\lambda^\alpha x, \lambda^\beta y)$)

тогда $g^*(x^{k-1} y^l dx) = \lambda^{\alpha(k-1) + \beta l} (x^{k-1} y^l dx)$

$g^*(x^k y^{l-1} dy) = \lambda^{\alpha k + \beta(l-1)} (x^k y^{l-1} dy)$

т.е. $g^*w = \lambda^d w$

Пример:



$x^3 dx + xy dx + y dy$
 $k=4, l=0 \quad k=2, l=1 \quad k=0, l=2 \quad \alpha=1, \beta=2 \quad d=4$

- 3) Решение уравнений с симметрией
 а) $\dot{x} = v(x)$ (автономное)

Утверждение

$\dot{x} = v(x)$ автономное \Leftrightarrow оно инвариантно относительно сдвигов $(t, x) \mapsto (t+s, x)$

Действительно, $dx = v(x) dt \mapsto dx = v(x) dt$

$v(t, x) \Downarrow v(t+s, x)$

8) Если $y' = v(x, y)$ - квазиоднородное с весами $\alpha=1, \beta=0$,
 то $\frac{dy}{dx} = v(x, y); g(x, y) = (\lambda x, y) \mapsto \frac{1}{\lambda} \frac{dy}{dx} = v(\lambda x, y) =$
 $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \lambda v(\lambda x, y) \Leftrightarrow v(\lambda x, y) = \frac{1}{\lambda} v(x, y)$, т.е. $\deg v = \beta - \alpha = -1$.
 $v(x, y) = \frac{1}{x} v(1, y) \forall x > 0$.

Замечание 1

$Mdx + Ndy = 0$ степени $d \Rightarrow M$ степени $d-d$
 с весами α, β N степени $d-\beta$.

тогда $\frac{dy}{dx} = -\frac{M}{N}$, $\deg\left(-\frac{M}{N}\right) = (d-\alpha) - (d-\beta) = \beta - \alpha$.

Замечание 2

Если сделать замену $\ln x = z$, то растяжение
 превращается в сдвиг ($x \mapsto \lambda x \Rightarrow z \mapsto z + \ln \lambda$)

тогда $y' = \frac{1}{x} v(1, y)$ $dy = \frac{dx}{x} v(1, y) = dz \cdot v(1, y)$ -
 автономное уравнение.

6) $\frac{dy}{dx} = v\left(\frac{y}{x}\right)$ - однородное уравнение (с весами $\alpha=1, \beta=1$) -
 сводится заменой $k = \frac{y}{x}$ к квазиоднородному
 уравнению с весами $\deg x = 1, \deg k = 0$.

2) $\frac{dy}{dx} = v(x, y)$ - квазиоднородное уравнение с весами α, β
 $\deg v = \beta - \alpha$

$y = kx^{\beta/\alpha}$ ($k = \frac{y}{x^{\beta/\alpha}}$) \Leftrightarrow приводит к тому,
 что в координатах (x, k) уравнение - с весами
 $\deg x = \alpha, \deg k = 0$.

Задача

В какой системе координат квазиоднородное
 растяжение с весами α, β становится
 сдвигом вдоль одной из осей?

4) Теоремы существования и единственности

Теорема 1 (Существования)

Если $\dot{\bar{x}} = \bar{v}(t, \bar{x})$ - система дифференциальных уравнений
 $\bar{v}(t, \bar{x}) = (v_1(t, \bar{x}), \dots, v_n(t, \bar{x}))$, $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, $v_1, \dots, v_n \in C(U)$,
то задача Коши для уравнения $\dot{\bar{x}} = \bar{v}(t, \bar{x})$
имеет решение

Будет доказана в конце семестра.

Теорема 2 (Единственности)

Пусть $\dot{\bar{x}} = \bar{v}(t, \bar{x})$. Если \bar{v} удовлетворяет условию
Липшица, то для уравнения выполнена глобальная
теорема единственности.

Доказана

Теорема 3 (Единственности)

Если $\dot{\bar{x}} = \bar{v}(t, \bar{x})$ - уравнение, $\frac{\partial v_i}{\partial x_j} \in C(U) \forall i, j = 1, \dots, n$, то
в каждой точке U выполнена локальная теорема
единственности, а значит, выполнена глобальная
теорема единственности.

Доказана по лемме

Лемма из математического анализа

Если $\frac{\partial v_i}{\partial x_j}$ ограничены в $(n+1)$ -мерном кубе, то
вектор-функция \bar{v} удовлетворяет условию Липшица
по \bar{x} $\|\bar{v}(t, \bar{x}) - \bar{v}(t, \bar{y})\| \leq M \|\bar{x} - \bar{y}\| \forall (t, \bar{x}), (t, \bar{y})$ из куба

Задача

Доказать лемму.

5) Продолжение решений систем дифференциальных уравнений

Определение

Пусть $\bar{\varphi}: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\bar{\psi}: J \rightarrow \mathbb{R}^n$ - решение СДУ.
 $\bar{\varphi}$ является продолжением решения $\bar{\psi}$, если $I \supset J$ и $\bar{\varphi}|_J = \bar{\psi}$

Определение

Решение $\bar{\varphi}$ называется непродолжимым, если у него нет
продолжений, отличных от него самого (т.е. если
 $\bar{\Theta}$ - продолжение $\bar{\varphi}$, то $\bar{\Theta} = \bar{\varphi}$)

Теорема единственности в целом

Пусть $\dot{\bar{x}} = \bar{v}(t, \bar{x}) - \text{CДУ}$, $\frac{\partial v_i}{\partial x_j} \in C(U)$.

Тогда задача Коши для $\dot{\bar{x}} = \bar{v}(t, \bar{x})$ в U имеет не более одного непродолжаемого решения.

Доказательство:

Пусть $\bar{\varphi}: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\bar{\psi}: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ - непродолжаемые решения,
 $t_0 \in I \cap \gamma$, $\bar{\varphi}(t_0) = \bar{\psi}(t_0)$.

Тогда по теореме единственности $\bar{\varphi}|_{I \cap \gamma} = \bar{\psi}|_{I \cap \gamma}$.

Рассмотрим $\bar{\Phi}(t) = \begin{cases} \bar{\varphi}(t), & t \in I \\ \bar{\psi}(t), & t \in \gamma \end{cases}$.

$\bar{\Phi}$ определена корректно в силу $\bar{\varphi}|_{I \cap \gamma} = \bar{\psi}|_{I \cap \gamma}$.

$\bar{\Phi}$ - решение (т.к. $\bar{\varphi}$ и $\bar{\psi}$ решения).

Тогда $\bar{\Phi}$ продолжение и $\bar{\varphi}$ и $\bar{\psi} \Rightarrow \bar{\varphi} = \bar{\psi} = \bar{\Phi}$.

Теорема существования и единственности в целом

Если $\dot{\bar{x}} = \bar{v}(t, \bar{x}) - \text{CДУ}$, $v_i, \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \in C(U)$, то для задачи Коши существует непродолжаемое решение.

Доказательство:

Пусть $S = \{ \bar{\varphi}: I_{\bar{\varphi}} \rightarrow \mathbb{R}^n \mid \bar{\varphi} \text{ - решение, } \bar{\varphi}(t_0) = \bar{x}_0, t_0 \in I_{\bar{\varphi}} \}$.

Пусть $\gamma = \bigcup_{\bar{\varphi} \in S} I_{\bar{\varphi}}$. $\gamma \neq \emptyset$ по теореме существования.

Положим $\forall t \in \gamma$ $\bar{\psi}(t) = \bar{\varphi}(t)$, если $t \in I_{\bar{\varphi}}$.

По теореме единственности определение корректно (если $t \in I_{\bar{\varphi}} \cap I_{\bar{\psi}}$, то $\bar{\varphi}(t) = \bar{\psi}(t)$).

$\bar{\psi}$ - решение т.к. все $\bar{\varphi}$ - решения.

Тогда $\bar{\psi}$ - решение, являющееся продолжением любого решения $\Rightarrow \bar{\psi}$ непродолжаемое.

// отсюда следует и единственность непродолжаемого решения.

Пример: $\dot{x} = x^2$, $x = \frac{1}{c-t}$ - общее решение $\frac{1}{1-t}$ - 2 непродолжаемых решения каждое единственно.

// если нет право единственности, то про непродолжаемые решения забывать нечего.